

برهمکنش ریزسازواره‌ها و کلات‌ها بر پالایش عناصر سنگین توسط گیاهان

حسن شهقلی^{۱*}، قاسم حسین طلائی^۲، مجتبی خواجه^۳

۱-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، الیگودرز، لرستان، ایران

۲-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، خرم آباد، لرستان، ایران

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل

h_agroo2000@yahoo.com

چکیده

امکان اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات سنگین از طریق روش‌های شیمیایی، فیزیکی و زیستی وجود دارد. گیاه‌پالایی از جمله روش‌های زیستی اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات سنگین است که در آن از روش‌های گیاهی خاصی به منظور جذب، انباشت، زدودن و تثبیت آلاینده‌های فلزی سمی استفاده می‌شود. کارایی استخراج فلزات سنگین به‌وسیله گیاهان مورد استفاده در این تکنولوژی به فاکتورهایی نظیر میزان زیست توده تولیدی گیاه و قابلیت جذب زیستی عناصر فلزی وابسته است. برخی از میکروارگانیسم‌های موجود در ریزوسفر گیاهان مانند باکتری‌های ارتقادهنده‌ی رشد و قارچ‌های میکوریزا از طریق سازوکارهایی نظیر تولید هورمون‌های گیاهی و فراهمی عناصر غذایی برای گیاهان تحت تنش موجب افزایش رشد و زیست توده تولیدی آن‌ها و به دنبال آن افزایش کارایی جذب و زدایش آلاینده‌های فلزی موجود در خاک می‌شوند. از طرفی، بسیاری از باکتری‌های ریزوسفیری نسبت به فلزات سنگین مقاوم بوده و از طریق تولید اسیدهای آلی قادر به انحلال فرم‌های غیرقابل جذب فلزات سنگین و در نتیجه افزایش جذب آن‌ها توسط گیاهان مقاوم هستند. در این مقاله مروری بر نقش میکروارگانیسم‌های ریزوسفیری و کلات‌ها در افزایش کارایی گیاه‌پالایی فلزات سنگین خواهیم داشت.

کلمات کلیدی: زیست پالایی، میکوریزا، عناصر سنگین.

مقدمه

خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند در طبیعت است که بدون داشتن آن حیات و زندگی بر روی زمین امکانپذیر نخواهد بود. ۹۵ درصد غذای انسان از خاک تهیه می‌شود و خاک علاوه بر نقشی که در تداوم حیات به عهده دارد در پیدایش حیات و تکامل نیز مؤثر بوده است (۱). از دیدگاه جهانی پس از آب و هوا، پوسته خاک سومین جزء عمده محیط زیست انسان تلقی می‌شود. هر گونه تغییر در ویژگی اجزای تشکیل دهنده خاک به طوری که استفاده از آن را ناممکن سازد، آلودگی خاک نامیده می‌شود. آلودگی خاک و آب به فلزات سنگین ضمن کاهش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی، پایداری تولید کشاورزی و سلامت افراد جامعه را نیز به خطر می‌اندازد (۴۸).

از انقلاب صنعتی تا به حال، آلودگی خاک به وسیله فلزات سنگین به طور شگفت‌انگیزی در حال پیشروی بوده است. حدود ۹۰ درصد انتشار فلزات سنگین از منابع مصنوعی و از سال ۱۹۰۰ میلادی اتفاق افتاده است (۲۵). در بین فلزات سنگین سرب یکی از خطرناک‌ترین آن‌ها است که به وسیله گیاهان جذب شده و گیاهان با جذب آن در معرض آلودگی به این عنصر قرار می‌گیرند و علاوه بر آنکه آسیب‌هایی به خود گیاه وارد می‌شود، سبب شده

تا انسان و دام‌هایی که از این گیاهان تغذیه می‌کنند نیز در معرض خطر آلودگی به این فلز قرار بگیرند. اگرچه پاک‌سازی خاک از طریق روش‌های فیزیکی و شیمیایی امکان پذیر است ولی تمام این روش‌ها نیاز به کارشناس و ابزارآلات دارند، از سوی دیگر این روش‌ها می‌توانند سبب از بین رفتن ساختمان خاک و اختلال در فعالیت‌های بیولوژیکی خاک و آلودگی بخش دیگری از محیط زیست شوند (۱۷). یکی از مهم‌ترین روش‌ها و فناوری‌هایی که طی دو دهه اخیر برای رفع مشکل آلودگی خاک در کشورهای مختلف گسترش یافته است، گیاه‌پالایی (Phytoremediation) نامیده می‌شود که در آن از کشت گیاهان مناسب در جهت پاک‌سازی و جذب و خارج ساختن آلاینده‌ها از خاک استفاده می‌شود (۱۷).

برای افزایش میزان جذب این فلزات از خاک‌های آلوده از برخی پارامترهای زیستی و شیمیایی خاص که مقرون به صرفه نیز هستند می‌توان استفاده کرد. اجتماعات میکوریزی به طور معنی‌داری جذب آب و مواد غذایی و تبادل کربن در گیاه را افزایش می‌دهند (۴۷). این قارچ‌ها توانایی رشد در خاک‌های آلوده را به صورت همزیست با ریشه گیاه دارند (۳۶). از طرفی استفاده از این قارچ‌ها به منظور پالایش مناطق آلوده از نظر

حفظ محیط زیست نیز نوعی برتری محسوب می‌شود. حضور جوامع زیستی در محیط رایزوسفر خاک پروژه زیست پالایی را با تحریک رشد گیاه و یا تجزیه ریشه‌ای گیاهان تشدید می‌کند (۴۱).

گیاه‌پالایی شیمیایی عبارت است از استفاده از ترکیبات شیمیایی نظیر کلات‌ها و اسیدها برای بهبود راندمان پالایش عناصر فلزی توسط گیاهان که به منظور افزایش حلالیت این عناصر در داخل خاک‌ها به کار گرفته می‌شود (۲۹). کلات‌ها می‌توانند فلزات را از فاز جامد و غیر محلول به فازهای تبادلی تبدیل کرده و در نهایت میزان جذب این فلزات توسط گیاهان را افزایش دهند.

۱ - فعالیت ریزسازواره‌های خاک

نتایج یک بررسی که بر روی پتانسیل گیاه-پالایی چند گونه گیاهی در مراحل جوانه زنی و در محیط آلوده به سرب صورت گرفت نشان داد که همزمان با افزایش محتوای این فلز در خاک (۱۰۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) از میزان درصد کلونیزاسیون قارچ‌های همزیست (میکوریز) در گونه گیاهی *Mimosa caesalpiniaefolia* کاسته شد (۴۴). در آزمایشی که سوزا و همکاران (۵۱) به منظور بررسی نقش همزیستی اکتومیکوریزها با گونه گیاهی *Pinus pinaster* و در محیط آلوده به فلز کادمیوم انجام داده بودند، دریافتند که از میزان

همزیستی این قارچ‌ها در سطوح ۱۵ و ۳۰ میلی‌گرم این آلاینده در کیلوگرم خاک، نسبت به سطح شاهد آلودگی کاسته شد.

چان و همکاران (۱۰) در پژوهشی که بر روی همزیستی قارچ‌های میکوریز با گیاه برنج (*Oryza sativa*) و در خاک‌های آلوده به آرسنیک انجام داده بودند، گزارش دادند که با افزایش سطح این آلاینده در خاک (۸۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) تفاوتی در میزان کلونیزاسیون گونه قارچی *Glomus geosporum* با ریشه گیاه مشاهده نشد، در صورتی که در گونه قارچی *Glomus mosseae* کم‌ترین میزان کلونیزاسیون ریشه در بالاترین سطح آلودگی به‌دست آمد. در آزمایشی که گارج و سینگلا (۲۰) به منظور بررسی نقش قارچ میکوریز گونه *Glomus mosseae* بر روی گونه گیاهی *Pisum sativum* و در محیط آلوده به آرسنیک انجام داده بودند، مشاهده کردند که همزمان با افزایش سطح آلودگی خاک به این فلز (۹۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک)، از میزان کلونیزاسیون این قارچ‌ها در گیاه کاسته شد.

۱-۱- فراهمی عناصر سنگین گیاه

دسوزا کاستا و همکاران (۱۵) پژوهشی بر روی پتانسیل گیاه‌پالایی کرچک (*Ricinus communis*) در محیط‌های آلوده به عناصر سرب و کادمیوم

انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش سطوح این آلاینده‌ها در محیط، غلظت این عناصر در بافت‌های هوایی و ریشه گیاهان نیز افزوده شد و بالاترین میزان عناصر سرب و کادمیوم به ترتیب در بافت‌های ریشه و هوایی گیاه به دست آمد. از سوی دیگر با افزایش محتوای آلاینده خاک میزان فاکتور انتقال این عناصر در گیاه کاسته شد. این کاهش برای عنصر کادمیوم محسوس‌تر بود. آن‌ها همچنین گزارش کردند که با افزایش سطوح سرب و کادمیوم خاک، نمودار شاخص تجمع زیستی این عناصر پس از یک دوره صعود که بر اثر افزایش غلظت این فلزات در خاک روی داد کاهش یافت. نمودار رسم شده برای این تغییرها به شکل سهمی بود. در تحقیقی که محمود و همکاران (۳۸) در زمین‌های آلوده به فلز کادمیوم بر روی کاهو انجام دادند مشاهده شد که با افزایش سطح آلاینده‌گی خاک (۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک) بر میزان غلظت کادمیوم بافت‌های هوایی گیاه افزوده می‌شود. سوکسوت و همکاران (۵۰) در پژوهشی که بر روی گونه گیاهی *Chara aculeata* و در خاک‌های آلوده به عناصر سنگین انجام داده بودند،

دریافتند که میزان غلظت عناصر سرب، روی و کادمیوم در بافت‌های این گیاه رابطه مستقیم با محتوای آلودگی خاک دارد و با افزایش محتوای این عناصر در خاک بر میزان غلظت آن‌ها در گیاه افزوده می‌شود.

۱-۲- فراهمی عناصر مغذی گیاه

تحت تأثیر سطوح بالای فلزات در خاک، میزان جذب آهن و گوگرد که در فعالیت بسیاری از آنزیم‌ها نقش دارند و یا به عنوان کوفاکتور در ساختارهای مولکولی ترکیب‌های مختلف شرکت می‌کنند تغییر می‌یابد (۴). چن و همکاران (۱۳) در پژوهشی که بر روی گیاه ذرت و در خاک‌های آلوده به فلز روی (تا سطح ۶۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک) انجام داده بودند، گزارش کردند که اثر این آلاینده بر میزان غلظت فسفر ریشه، ساقه و برگ گیاه معنی‌دار است و با افزایش سطح آن در محیط، غلظت فسفر در گیاه نیز افزوده شده است. هرناندزاورتگا و همکاران (۲۳) در تحقیقی که در خاک‌های آلوده بر روی گیاه *Melilotus albus* به هیدروکربن‌های نفتی (سوخت دیزل) انجام داده بودند دریافتند که با افزایش سطح آلودگی در این خاک‌ها از محتوای عناصر کلسیم، روی، مس، منگنز، آهن، پتاسیم و فسفر گیاه کاسته شده است.

۲- تأثیر ریزسازواره‌های خاک در گیاه‌پالایی

حضور جوامع زیستی در رایزوسفر گیاهان فعل و انفعالات زیست پالایی را با تحریک و افزایش جذب و یا تجزیه آلودگی تشدید می‌کند (۴۱). بسیاری از ریزسازواره‌های خاک قادر به محلول کردن فرم‌های غیر قابل جذب کانی‌های معدنی حاوی فلزات سنگین، از طریق ترشح اسیدهای آلی هستند (۲۸). سازوکارهای عمده‌ای که ریزسازواره‌های خاک توسط آن‌ها می‌توانند استرس ناشی از فلزات سنگین را در گیاهان بکاهند به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند که عبارت است از: ۱- کاهش غلظت عناصر سنگین در خاک ۲- افزایش رشد گیاه (۳۰). اثرات متقابل بین میکروارگانیسم‌های خاک و گیاهان در فرآیند گیاه‌پالایی مؤثر هستند (۳۴) بدین نحو که ریزسازواره‌های خاک سبب افزایش تولید تنظیم کننده‌های رشد و افزایش جذب آب و مواد غذایی در گیاهان شده، در نتیجه رشد گیاه را افزایش دادند (۴۱).

۲-۱- تأثیر قارچ‌های میکوریز در گیاه‌پالایی

سازوکارهایی که قارچ‌های میکوریز به منظور کاهش اثرات تنش فلزات سنگین بر روی گیاهان اعمال می‌کنند شامل کلاته کردن و غیر پویایی فلزات سنگین در میسلیم‌های خارجی، بهبود تغذیه معدنی به ویژه فسفر، تغییر pH رایزوسفر خاک،

تنظیم بیان ژن‌های پروتئین‌های ناقل فلزی و غیره هستند (۲۷؛ ۲۱). علاوه بر این‌ها قارچ‌های میکوریز ممکن است عناصر را در بافت‌های خود، برای مثال در واکوئل‌ها و یا در میسلیم‌های میکوریزی خود ذخیره کرده و اثر سمیت آن‌ها را در گیاه به حداقل برسانند (۱۲).

در مجموع، در زیست فراهمی عناصر سنگین توسط همزیستی قارچ‌های میکوریز با ریشه گیاهان نتایج متفاوتی حاصل می‌شود که ناشی از: ۱- گونه گیاه و غلظت عنصر آلاینده ۲- وجود بیش از یک عنصر و اثرات متقابل بین آن‌ها ۳- ویژگی خاک ۴- نوع همزیستی بین گیاه و میکروارگانیسم‌های خاک ۵- شرایط رشدی گیاهان ۶- حجم و تراکم ریشه گیاه است (۷؛ ۹).

۲-۲- مطالعه موردی تأثیر قارچ‌های میکوریز بر

گیاهان در محیط آلوده

۲-۲-۱- شاخص‌های مورفولوژیکی گیاه

چان و همکاران (۱۰) در پژوهشی که بر روی تأثیر همزیستی قارچ‌های میکوریز با گیاه برنج و در خاک‌های آلوده به آرسنیک انجام داده بودند، مشاهده کردند که کمترین مقدار زیست توده اندام‌های هوایی و ریشه این گیاه، در بالاترین سطح آلودگی (۸۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک) و در شرایط عدم تلقیح با قارچ‌های آرباسکول (*Glomus*)

درحالی که در گیاهان همزیست با این قارچ‌ها، تأثیر تنش بر روی عملکرد گیاه کم‌تر محسوس بود. بالاترین میزان بیوماس خشک در این اندام‌ها در کمترین سطح آلودگی و در گیاهان همزیست با قارچ به دست آمد.

هرناندزاورتگا و همکاران (۲۳) در پژوهشی که بر روی گونه گیاهی *Melilotus albus* و در خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی (سوخت دیزل) انجام داده بودند، مشاهده کردند که همزمان با افزایش سطح آلودگی این خاک‌ها، از میزان بیوماس زیست توده کل گیاه کاسته شد. در صورتیکه نمونه‌های تلقیح شده با قارچ کم‌تر تحت تأثیر این تنش قرار گرفتند. سولیس‌دومینگوز و همکاران (۴۹) در آزمایشی که به منظور بررسی نقش گونه قارچی *Glomus intraradices* در گیاه کهور و در حوالی معدن کلوندیک آمریکا (حاوی پسماندهای روی و سرب) انجام داده بودند، مشاهده کردند که این قارچ‌ها سبب افزایش طول ریشه در گیاهان همزیست نسبت به گیاهان شاهد شدند. نتایج حاصل از پژوهشی که سودوا و واساتکا (۵۲) بر روی گیاه توتون و در شرایط محیطی آلوده به سرب انجام دادند نشان داد که استفاده از این قارچ‌ها سبب افزایش چشم‌گیر زیست توده ریشه در این گیاه شد.

mosseae) و بیشترین میزان آن نیز در کمترین سطح آلودگی خاک و در شرایط تلقیح با قارچ‌های آرباسکول به دست آمد.

بسراکاسترو و همکاران (۸) در پژوهشی که به منظور بررسی نقش چند گونه از ریزسازواره‌های خاکری در فرآیند گیاه‌پالایی و در زمین‌های آلوده به عناصر کادمیوم و روی انجام داده بودند، دریافتند که اکثر این ریزسازواره‌ها سبب افزایش میزان زیست توده گونه‌های گیاهی *Festuca pratensis* و *Salix caprea* شد. در آزمایشی که به منظور بررسی تأثیر همزیستی قارچ‌های میکوریز در فرآیند گیاه‌پالایی گونه گیاهی *Pteris vittata* در خاک‌های آلوده به آرسنیک صورت گرفت، مشاهده شد که استفاده از قارچ‌های میکوریز گونه موسه‌ای (*Glomus mosseae*) سبب افزایش میزان زیست توده اندام‌های هوایی گیاه در تمام سطوح آلاینده شده است (۳۱).

گارج و سینگلا (۲۰) در پژوهشی که به منظور بررسی نقش گونه قارچی *Glomus mosseae* در گیاه نخودفرنگی (*Pisum sativum*) و در محیط آلوده به فلز آرسنیک انجام داده بودند، مشاهده کردند که همزمان با افزایش محتوای آلاینده خاک تا سطح ۹۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک، از میزان وزن خشک اندام‌های هوایی و ریشه گیاه کاسته شد.

۲-۲-۲- شاخص‌هاى كیفى گياه

در تحقيقى كه پاناميا و همكاران (۴۳) بر روى گونه گياهى *Chrysopogon zizanioides* و در محيط آلوده به سرب انجام دادند، گزارش كردند كه اثرات متقابل فلز سرب و قارچ‌هاى ميكوريز بر ميزان رنگيزه فتوستتزي اين گياهان معنى‌دار بود. بدین نحو كه با افزايش محتوای آلاینده خاک (تا سطح ۱۲۰۰ میلی‌گرم بر كيلوگرم خاک) از محتوای كلروفیل a و b در این گیاه كاسته شد وليكن گياهان همزیست با قارچ كم‌تر تحت تأثیر تنش قرار گرفته بودند.

گارج و سينگلا (۲۰) در پژوهشى كه به منظور بررسى نقش سويه قارچى *Glomus mosseae* بر روى گونه گياهى *Pisum sativum* و در محيط آلوده به آرسنيك انجام داده بودند، مشاهده كردند كه كم‌ترين ميزان رنگيزه فتوستتزي در بالاترين سطح آلايندگى خاک (۹۰ میلی‌گرم بر كيلوگرم خاک) و در گياهان شاهد مشاهده شد. ليكن گياهان همزیست با قارچ سهم بيشترى از رنگيزه‌هاى فتوستتزي را در بافت‌هاى سبزینه خود انباشته بودند. آن‌ها همچنين گزارش كردند كه تحت تأثیر تنش محتوای نسبى آب در بخش‌هاى هوايى گياه و محتوای پروتئين بافت‌هاى مختلف كاهش يافته است. علت این تغييرها مى‌تواند ناشى از تخریب

بافت‌هاى گياه در سطوح بالای آلودگى باشد. در رابطه با این دو صفت بيشترين مقادير در نمونه‌هاى گياهى همزیست با قارچ و در كم‌ترين سطح آلودگى مشاهده شد. از سوى ديگر با افزايش سطح آلايندگى خاک بر محتوای گليستين، بتاين و پرولين گياهان افزوده شد و به دنبال آن مقاومت گياهان افزايش يافت. بالاترين محتوای این مواد در بالاترين سطح آلودگى و در گونه‌هاى گياهى همزیست با قارچ به دست آمد.

در تحقيقى كه به منظور بررسى نقش قارچ‌هاى آرباسكولار در گياه‌پالايى گياه ذرت و در خاک‌هاى آلوده به كادميوم صورت گرفت مشاهده شد كه گياهان همزیست با این قارچ‌ها نسبت به ساير گياهان مقادير بيشترى از پروتئين را در اندام‌هاى خود انباشته بودند. همچنين با افزايش محتوای آلايندگى خاک، از ميزان طول ميسليوم‌هاى خارجى این قارچ‌ها كاسته شد (۵).

۲-۲-۳- فراهمى عناصر سنگين گياه

در آزمایشى كه اورلوسكا و همكاران (۴۲) به منظور بررسى نقش قارچ‌هاى آرباسكولار بر فرآيند گياه‌پالايى گياه بارهنگ (*Plantago lanceolata*) انجام داده بودند، گزارش كردند كه گياهان همزیست با این قارچ‌ها نسبت به گياهان شاهد حاوى مقادير بالاترى از عناصر سرب، كادميوم،

میکوریز بر میزان غلظت این فلز در بافت ریشه گیاه معنی دار بوده و بیشترین میزان آن در بالاترین سطح آلودگی محیط و در گیاهان شاهد به دست آمد.

در تحقیقی که بر روی پتانسیل گیاه‌پالایی گیاهانی از گونه‌های *Schizolobium parahyba* و *Erythrina speciosa* در مرحله جوانه‌زنی و در محیط آلوده به سرب صورت گرفت، مشاهده شد که همزمان با افزایش محتوای سرب خاک تا سطح ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک، از میزان فاکتور تغلیظ زیستی در این گونه‌های گیاهی کاسته شد (۴۴). در آزمایشی که به منظور بررسی تأثیر همزیستی قارچ‌های آرباسکولار در گونه گیاهی *Cynodon dactylon* و در خاک‌های آلوده به آرسنیک صورت گرفت، عنوان شد که استفاده از قارچ‌های میکوریز گونه موسه‌ای در سطوح ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم سرب بر کیلوگرم خاک، سبب افزایش میزان غلظت آرسنیک در ریشه این گونه گیاهی شدند (۳۱).

۲-۲-۴- فراهمی عناصر مغذی گیاه

پژوهش‌های زیادی در مورد نقش این قارچ‌ها و اثرات سودمند آن‌ها در گیاهان صورت گرفته است، بهبود تولید در گیاهان میکوریزی را به جذب بیشتر عناصر غذایی غیر متحرک مانند فسفر، روی و مس نسبت داده‌اند (۴۷). چان و همکاران (۱۰)

آرسنیک و روی در اندام‌های خود بودند. سولیس-دومینگوز و همکاران (۴۹) در آزمایشی که بر روی گیاهان حوالی معدن کلونیدیک آمریکا انجام داده بودند، عنوان کردند که قارچ‌های میکوریز سبب افزایش تجمع عناصر روی و کادمیوم در اندام‌های هوایی این گیاهان شده بودند در حالی که بین گیاهان همزیست و شاهد از لحاظ انباشت سرب تفاوت چشمگیری مشاهده نشد. دماریا و همکاران (۱۴) گزارش دادند که تلقیح گیاهان با ریزسازواره‌های رایزوسفر، سبب افزایش فاکتور انتقال عناصر روی و کادمیوم از ریشه به بافت برگ گونه گیاهی *Salix caprea* شد.

در آزمایشی که گارج و سینگلا (۲۰) بر روی گونه قارچی *Glomus mosseae* و در محیط‌های آلوده به آرسنیک انجام دادند، گزارش کردند که با افزایش میزان آلودگی خاک تا سطح ۹۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک، بر میزان غلظت این فلز در بافت‌های هوایی و ریشه گیاه افزوده شد و این در صورتی بود که قارچ میکوریز سبب کاهش انتقال فلز از خاک به اندام‌های گیاه شد. در آزمایشی که سوزا و همکاران (۱۶) به منظور بررسی نقش اکتومیکوریزها در همزیستی با گونه گیاهی *Pinus pinaster* و در محیط آلوده به کادمیوم انجام داده بودند، گزارش کردند که برهمکنش کادمیوم و قارچ

در تحقيقى كه بر روى تأثير همزيستى قارچ‌هاى ميكوريز در گياه برنج و در خاك‌هاى آلوده به آرسنيك انجام داده بودند، دريافتند كه نمونه‌هاى گياهى همزيست با اين قارچ، در تمام سطوح آلاينده حاوى مقادير بالاترى از فسفر در بافت‌هاى هوايى و ريشه خود بودند. مالكووا و همكاران (۳۵) در پژوهشى كه به منظور بررسى نقش گونه قارچى *Glomus intraradices* در گونه‌هاى گياهى *Agrostis capillaris* و *Zea mays* و در اماكن آلوده به فلزات سنگين انجام داده بودند، گزارش كردند كه تيمارهاى گياهى تلقيح شده با اين قارچ، در تمامى سطوح آلاينده حاوى غلظت بيشترى از عنصر فسفر در بافت‌هاى خود بودند.

هرناندزاورنگا و همكاران (۲۳) در پژوهشى كه بر روى گونه گياهى *Melilotus albus* و در خاك‌هاى آلوده به هيدروكربن‌هاى نفتى (سوخت ديزل) انجام داده بودند، گزارش كردند كه قارچ‌هاى ميكوريز سبب افزايش تجمع عناصر نيتروژن، فسفر، پتاسيم، آهن، كلسيم، روى، منگنز، منيزيم و مس در تمامى سطوح آلاينده نسبت به گياهان شاهد شدند. در آزمائشى كه گارج و سينگلا (۲۰) به منظور بررسى نقش قارچ همزيست ميكوريز در گونه گياهى *Pisum sativum* و در محيط آلوده به آرسنيك انجام داده بودند، دريافتند كه همزمان با

افزايش سطح اين آلاينده در خاك (۹۰ مىلى گرم بر كيلوگرم خاك) از محتوای فسفر اندام‌هاى هوايى و ريشه گياه كاسته شد و اين كاهش در اندام ريشه نسبت به زيست توده هوايى محسوس‌تر بود، درحالى كه نمونه‌هاى گياهى همزيست با قارچ حاوى مقادير بالاترى از اين عنصر در تمام سطوح آلاينده بودند.

در آزمائشى كه به منظور بررسى نقش قارچ‌هاى ميكوريز در فرآيند گياه‌پالايى گونه گياهى *Pteris vittata* و در خاك‌هاى آلوده به آرسنيك صورت گرفت، عنوان شد كه استفاده از قارچ‌هاى ميكوريز گونه موسه‌اى، سبب افزايش محتوای فسفر بافت ريشه در سطح شاهد آلاينده نسبت به گياهان شاهد در همان سطح از آلاينده شد (۳۱).

۳- تأثير كلاتورها در گياه‌پالايى

تثبيت فلزات سنگين در بين ذرات خاك يك مشكل عمده در حلاليت و جذب آن‌ها از خاك است (۴۶). پژوهش‌ها نشان داده است كه ديواره سلول‌هاى آوند چوبى به دليل داشتن ظرفيت تبادل كاتيونى بالا سبب تاخير در حركت كاتيون‌هاى فلزى به سمت بافت‌هاى هوايى گياه مى‌شوند (۱۸). گياه-پالايى شيميايى عبارت است از كاربرد تركيبات شيميايى و مواد آلى براى بهبود راندمان پالايش عناصر فلزى توسط گياهان كه به منظور افزايش

حلالیت عناصر فلزی در خاک بکار گرفته می‌شود (۲۹). افزودن آمینو پلی کربوکسیلیک اسیدها به خاک، در برهه‌ای از رشد که گیاهان در حداکثر رشد (مرحله پایانی) هستند صورت می‌گیرد. در این مرحله به دلیل تعرق بالای گیاه، مقدار قابل توجهی از کمپلکس‌های فلزی طی جریان توده‌ای از سمت ریشه گیاه حرکت نموده و به شاخساره انتقال می‌یابند (۳۲).

ورود هر یون به درون سلول‌های ریشه و انتقال آن به آوند چوبی از دو مسیر سیمپلاستی (انتقال از سلولی به سلول دیگر از محل پلاسمالما) و آپوپلاستی (انتقال از فضای مابین دیواره خارجی دو سلول) انجام می‌گیرد. انتقال یون از مسیر آپوپلاستی به دلیل غیر اختصاصی بودن فرآیند جذب سریع تر از مسیر سیمپلاستی صورت می‌گیرد. در حضور آمینو پلی کربوکسیلیک اسیدها انتقال فلز به صورت غیر اختصاصی و از مسیر آپوپلاستی است و در شرایط عدم حضور این ترکیبات، جذب این فلزات به صورت اختصاصی و از مسیر سیمپلاست خواهد بود (۴۰). وجود پیوندهای آلی-فلزی در ترکیب کلات و فلز سبب می‌شود که فلزات کمتر در معرض کلوئیدها، هیدروکسیدها و اکسیدها قرار گرفته در نتیجه کمتر در خاک رسوب یا تثبیت شوند. از طرفی این ترکیب‌ها توسط ریشه گیاهان

قابل جذب بوده و می‌توانند با تبدیل فلزات از شکل جامد و غیر محلول به اشکال قابل تبادل، جذب آن‌ها را توسط گیاهان افزایش دهند (۲) (شکل ۱). EDT سبب نابودی مانع‌های فیزیولوژیکی موجود در ریشه از طریق حذف کاتیون‌های Fe^{2+} و Ca^{2+} می‌شود که نقش مهمی در خاصیت انتخاب-پذیری غشای پلاسمای سلول‌های ریشه دارند (۴۰). یافته‌های آزمایشی نشان داد که کلات کننده‌های شیمیایی و آلی با تأثیر مثبت بر تحرک فلزات سنگین در خاک، قدرت گیاه پالایی را افزایش دادند (۱۱).

به نظر می‌رسد که مولکول‌های EDTA می‌توانند سلول‌های جدار ریشه و یا ناقلین عناصر را که در روی سلول‌های جدار ریشه قرار دارند تخریب کرده و همراه فلزی که آن را کلاته کرده‌اند به راحتی از این سلول‌ها عبور کنند (۳۳).

۳-۲- مطالعه موردی تأثیر کلاتور بر گیاهان در محیط آلوده


۳-۲-۱- شاخص‌های مورفولوژیکی گیاه

در یک بررسی که بر روی گیاه ذرت و در خاک‌های آلوده به سرب صورت گرفت، مشاهده شد که استفاده از کلات EDTA سبب کاهش میزان طول ریشه و اندام‌های هوایی در این گیاه شد (۲۲). در تحقیقی که به منظور بررسی نقش عوامل کلات

"شهقلى و همكاران، برهم كنش ريزسازواره‌ها و كلات‌ها بر پالایش عناصر سنگین توسط گیاهان"

سطوح بالا سبب کاهش میزان وزن تر و خشک و

کننده در پاک‌سازی محیط آلوده به اورانیوم صورت گرفت، گزارش شد که استفاده از این عوامل در



شکل (۱) مسیر جذب عناصر در گیاهان، ویندی و همکاران (۵۶).

آلوده به فلز کادمیوم انجام داده بودند، دریافتند که با افزایش میزان آلودگی خاک به این فلز تا سطح ۳۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک، از میزان زیست توده اندام‌های هوایی و زیرین گیاه کاسته شد. شیب

همچنین ارتفاع گیاه شدند (۲۶). محمود و همکاران (۳۸) در پژوهشی که به منظور بررسی تأثیر کلات *Diethylene Triamine Penta (DTPA)* بر روی گیاه کاهو و در زمین‌های *Aceticacid*

حضور کلاتور و با افزایش سطح آلودگی خاک از میزان بیوماس زیست توده خشک بافت هوایی گیاه و به خصوص از بیوماس زیست توده ریشه کاسته شد. درحالی که در گیاهان تیمار شده با کلاتور این کاهش عملکرد محسوس تر بود (۵۴).

در تحقیقی که به منظور بررسی تأثیر کلاتور EDTA بر روی گیاه ذرت و در زمین های آلوده به آرسنیک صورت گرفت، مشاهده شد که در صورت استفاده از این کلاتور از میزان ارتفاع کل، ارتفاع ساقه و وزن خشک اندام های هوایی و ریشه گیاه کاسته شد (۳). نیوشواتر و همکاران (۳۹) در یک پژوهش دو وجهی گلدانی و مزرعه ای که بر روی گیاه ذرت و در خاک های آلوده به عناصر سرب و کادمیوم انجام داده بودند، مشاهده کردند که میزان زیست توده این گیاه رابطه عکس با محتوای EDTA در خاک داشت و همزمان با افزایش میزان مصرف این کلاتور در خاک از میزان زیست توده گیاه کاسته شد.

۳-۲-۲- شاخص های کیفی گیاه

در غلظت های بالای سرب و آمینو پلی کربوکسیلیک اسید، علائم سمیت این مواد به صورت خشکیدگی، نکروز و پیچیدگی حاشیه برگ ها مشاهده می شود. این علائم به دلیل جذب سریع کمپلکس های سرب و شکل آزاد EDTA در

کاهش زیست توده در ریشه به مراتب شدیدتر از بافت های هوایی گیاه بود. در گیاهان تیمار شده با کلات، میزان کاهش زیست توده نسبت به گیاهان شاهد (عدم اعمال کلات) بیشتر بود.

در تحقیقی که سودوا و همکاران (۵۳) بر روی گیاه توتون و در شرایط خاکی آلوده به سرب انجام داده بودند، مشاهده کردند که با افزایش سطح مصرف کلاتور EDDS (Ethylene Diamin Di Succinate) در خاک، از میزان زیست توده خشک اندام های هوایی و زیرین گیاه کاسته شد. در آزمایشی دیگر که به منظور بررسی تأثیر کلاتورهای EDDS و NTA (Nitrilo Tiacetic Acid) بر فرآیند گیاه پالایی اسفناج و در خاک های آلوده به کادمیوم صورت گرفت، مشاهده شد که میزان زیست توده خشک اندام های هوایی و زیرین و همچنین ارتفاع این گیاه، رابطه عکس با محتوای این عنصر در خاک داشتند. با افزایش سطح آلودگی خاک به این فلز، از میزان این صفات در گیاه کاسته شد. با استفاده از این کلاتورها (تا سطح ۵ میلی مول بر کیلوگرم خاک) در تمامی سطوح آلاینده از میزان این صفات کاسته شد (۲۴). در آزمایشی دیگر که به منظور بررسی نقش کلاتور EDDS در گیاه پالایی خاک های آلوده به سرب صورت گرفت، مشاهده شد که در حضور و یا عدم

شاخساره و اختلال در فتوسنتز و كلروفيل سازى برگ روى مى‌دهد (۳۸). سس و همكاران (۴۵) در پژوهشى كه به منظور بررسى تاثير كلاتور EDTA در سطوح ۱۴ و ۲۸ (مىلى مول بر كيلوگرم خاك) بر روى گياه آفتاب‌گردان و در محيط آلوده به سرب انجام داده بودند، گزارش كردند كه اثرات متقابل سرب و كلاتور بر محتوای پروتئين گياه معنى‌دار بود و كم‌ترين ميزان آن در بالاترين سطح سرب و عدم مصرف كلاتور به دست آمد. جاگتيا و شارما (۲۶) در تحقيقاتى كه به منظور بررسى نقش عامل كلات كننده EDTA در محيط آلوده به اورانيوم و بر روى گياه خردل هندى (*Brassica juncea*) انجام داده بودند، دريافتند كه با افزايش ميزان مصرف اين كلاتور در محيط از ميزان شاخص تحمل اين گياه كاسته شد. در آزمائشى كه به منظور بررسى نقش كلاتور EDTA در گياه ذرت و در زمين‌هاى آلوده به فلز آرسنيك صورت گرفت مشاهده شد كه محتوای رنگيزه فتوسنتزى اين گياه با مقدار كلاتور اضافه شده به خاك رابطه عكس داشت (۳).

۳-۲-۳- فعاليت ميكروارگانيسم‌هاى خاك

در پژوهشى كه به منظور بررسى تاثير عوامل كلات كننده بر روى گياهان و در محيط آلوده به سرب صورت گرفت مشاهده شد كه با افزايش

محتوای اين آلاينده تا سطح ۵۰۰ مىلى گرم بر كيلوگرم خاك، در ميزان متابوليک (فعاليت) ريزسازواره‌هاى خاك‌زى اختلاف چشم‌گيرى مشاهده نشد وليكن در گياهانى كه در آنها از عامل كلات كننده استفاده شده بود از ميزان متابوليک ريزسازواره‌هاى خاك‌زى كاسته شد (۱۹). در تحقيقاتى كه سودوا و همكاران (۵۳) به منظور بررسى نقش عامل كلات كننده EDDS بر روى گياه توتون و در شرايط محيطى آلوده به سرب انجام داده بودند، گزارش كردند كه كم‌ترين ميزان كلونيزاسيون و طول ميسليوم‌هاى قارچ‌هاى ميكوريز، در بالاترين سطح آلاينده و کاربرد ۵ مىلى مول از كلاتور به دست آمد. ماركوييز و همكاران (۳۷) در آزمائشات خود كه به منظور بررسى نقش كلاتور EDTA بر ميزان كلونيزاسيون قارچ‌هاى همزيست با گياه تاج ريزى سياه (*Solanum nigrum*) و در خاك‌هاى آلوده به فلز روى انجام داده بودند، گزارش كردند كه ميزان كلونيزاسيون اين قارچ‌ها رابطه عكس با مصرف كلاتور در خاك داشته و با افزايش سطح مصرف اين ماده در خاك، از ميزان كلونيزاسيون قارچى ريشه گياه كاسته شد.

۳-۲-۴- فراهمی عناصر سنگین گیاه

محمود و همکاران (۳۸) در پژوهشی که به منظور بررسی تأثیر کلاتور DTPA بر روی گیاه کاهو و در زمین‌های آلوده به کادمیوم انجام داده بودند، گزارش کردند که در حضور و یا عدم حضور کلاتور در خاک با افزایش سطح آلودگی کادمیوم، بر میزان غلظت این فلز در گیاه افزوده شد. درحالی‌که در صورت استفاده از این کلاتور در تمامی سطوح آلاینده، تجمع این آلاینده در گیاه شدت گرفت. عباس و ابوالحافظ (۱) در آزمایشی که در محیط آلوده به فلز آرسنیک انجام داده بودند، گزارش کردند که میزان غلظت این فلز در ریشه و بافت‌های هوایی گیاه رابطه مستقیم با مصرف کلاتور در خاک داشت. همچنین اعمال تیمار کلاتور در این خاک‌ها سبب افزایش معنی‌دار شاخص انتقال شد.

جاگتیا و شارما (۲۶) در پژوهشی که به منظور بررسی نقش عوامل کلات کننده در پاک‌سازی محیط آلوده به اورانیوم انجام داده بودند، مشاهده کردند که با افزایش مصرف کلاتور در محیط، بر محتوای این عنصر در بافت‌های هوایی و ریشه خردل هندی افزوده شد. ژائو و همکاران (۵۶) در آزمایشات خود دریافتند که استفاده از کلاتور EDTA سبب افزایش معنی‌دار میزان جذب عناصر

سرب، مس و کادمیوم در اندام‌های هوایی ذرت شد و از سوی دیگر، استفاده از این عامل سبب تشدید انتقال سرب از مسیرهای سیمپلاستی نسبت به مسیرهای غیر سیمپلاستی شد.

در آزمایشی که به منظور بررسی نقش عامل کلات کننده EDTA بر روی گونه گیاهی *Cynara cardunculus* و در خاک‌های آلوده به سرب صورت گرفت مشاهده شد که با اعمال این عامل در خاک، میزان فاکتور انتقال سرب در گیاه افزایش یافت (۱۹). در پژوهشی که نیوشواتر و همکاران (۳۹) بر روی گیاه سورگوم انجام داده بودند، گزارش کردند که میزان تجمع فلز سرب در این گیاه رابطه مستقیم با مصرف کلاتور EDTA در خاک‌های آلوده داشت. هسو و همکاران (۲۴) در پژوهشی که بر روی گونه گیاهی *Ipomoea aquatica* و در آب‌های آلوده انجام دادند، عنوان کردند که با مصرف کلاتور EDDS، میزان غلظت و جذب کادمیوم در اندام‌های هوایی گیاه را به صورت معنی‌داری افزایش یافت.

نتیجه گیری

با بهره‌گیری از روابط طبیعی می‌توان بر بسیاری از مشکلاتی که بشر به‌واسطه‌ی جاه‌طلبی بر محیط زیست تحمیل کرده است، هموار کرد. گیاه‌پالایی، یکی از فن‌آوری‌های طبیعی موجود جهت رسیدگی

تحت تنش، امکان بهبود رشد گیاه و افزایش میزان جذب و زدایش فلزات سنگین طی فرآیند گیاه‌پالایی وجود دارد. بنابراین، ارتقای روابط متقابل میان گیاه و ریزسازواره‌های ریزوسفری یکی از مهمترین عوامل جهت دستیابی به کارایی مطلوب گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین است.

به معضل تجمع فلزات سنگین در خاک است که سازگار با محیط زیست بوده و در مقایسه با روش‌های فیزیکی و شیمیایی از فواید بیشماری نظیر افزایش تنوع زیستی و کاهش فرسایش خاک برخوردار است. نتایج پژوهش‌های مختلف حاکی از آن هستند که با بهره‌برداری از ارتباط‌های متقابل میان برخی از ریزسازواره‌های ریزوسفری و گیاهان

References

منابع مورد استفاده:

۱. دبیری م. (۱۳۷۵). آلودگی محیط زیست (هوا، آب، خاک، صوت)، انتشارات اتحاد. صفحه ۳۳۱-۳۳۸.
۲. فتاحی الف، آستارایی ع. ر و حق نیا غ. ح. (۱۳۸۹). بررسی اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه‌پالایی سه گیاه ذرت، آفتابگردان و پنبه. علوم و فنون کشاورزی. ۵۷: ۶۸-۵۷.
3. **Abbas M. H. and Abdelhafez A. A. (2013).** Role of EDTA in arsenic mobilization and its uptake by maize grown on an As-polluted soil. *Journal of Mycorrhiza Chemosphere*.90: 588-594.
4. **Akinci I. E, Akinci S and Yilmaz K. (2010).** Response of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) to lead toxicity: Growth, element uptake, chlorophyll and water content. *Journal of Mycorrhiza Afr J Agric Res*. 5(6): 416-423.
5. **Andrade S. A. D and Silveira A. P. D. (2008).** Mycorrhiza influence on maize development under Cd stress and P supply. *Brazilian Journal of Plant Physiology*. 20(1): 39-50.
6. **Audet, P and Charest, C. (2007).** Dynamics of arbuscular mycorrhizal symbiosis in heavy metal phytoremediation: meta-analytical and conceptual perspectives. *Journal of Environmental Pollution*. 147(3): 609-614.
7. **Baum, C, Hryniewicz K, Leinweber P and Meißner R. (2006).** Heavy-metal mobilization and uptake by mycorrhizal and nonmycorrhizal willows (*Salix*× *dasyclados*). *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*. 169(4): 516-522.
8. **Becerra-Castro C, Monterroso C, Prieto-Fernández A, Rodríguez-Lamas L, Loureiro-Viñas M, Acea M. J and Kidd P. S. (2012).** Pseudometallophytes colonising Pb/Zn mine tailings: a description of the plant-microorganism-rhizosphere soil system and isolation of metal-tolerant bacteria. *Journal of Hazardous Materials*. 217: 350-359.

9. **Bi Y. L, Li X. L and Christie P. (2003).** Influence of early stages of arbuscular mycorrhiza on uptake of zinc and phosphorus by red clover from a low-phosphorus soil amended with zinc and phosphorus. *Journal of Chemosphere*. 50(6): 831-837.
10. **Chan W. F, Li H, Wu F. Y, Wu S. C and Wong M. H. (2012).** Arsenic uptake in upland rice inoculated with a combination or single arbuscular mycorrhizal fungi. *Journal of Hazardous Materials*.
11. **Chehregani A. B. D. O. L. K. A. R. I. M and Malayeri B. (2007).** Removal of heavy metals by native accumulator plants. *International Journal of Agriculture and Biology*. 9(3): 462-465.
12. **Chen B. D, Li X. L, Tao H. Q, Christie P and Wong M. H. (2003).** The role of arbuscular mycorrhiza in zinc uptake by red clover growing in a calcareous soil spiked with various quantities of zinc. *Journal of Chemosphere*. 50(6): 839-846.
13. **Chen B, Shen H, Li X, Feng G and Christie P. (2004).** Effects of EDTA application and arbuscular mycorrhizal colonization on growth and zinc uptake by maize (*Zea mays* L.) in soil experimentally contaminated with zinc. *Journal of Plant and Soil*. 261(1-2): 219-229.
14. **De Maria S. Rivelli A. R, Kuffner M, Sessitsch A, Wenzel W. W, Gorfer M and Puschenreiter M. (2011).** Interactions between accumulation of trace elements and macronutrients in *Salix caprea* after inoculation with rhizosphere microorganisms. *Journal of Chemosphere*. 84(9): 1256-1261.
15. **de Souza Costa E. T, Guilherme L. R. G, de Melo É. E. C, Ribeiro B. T, Euzelina dos Santos B. I, da Costa Severiano E and Hale B. A. (2012).** Assessing the Tolerance of Castor Bean to Cd and Pb for Phytoremediation Purposes. *Journal of Biological Trace Element Research*. 145(1): 93-100.
16. **De Souza L. A, de Andrade S. A. L, de Souza S. C. Rand Schiavinato M. A. (2012).** Arbuscular mycorrhiza confers Pb tolerance in *Calopogonium mucunoides*. *Journal of Acta Physiologiae Plantarum*. 34(2): 523-531.
17. **Del Río-Celestino M, Font R, Moreno-Rojas R and De Haro-Bailón A. (2006).** Uptake of lead and zinc by wild plants growing on contaminated soils. *Journal of Industrial Crops and Products*. 24(3): 230-237.
18. **Dushenkov V, Kumar P. N, Motto H and Raskin I. (1995).** Rhizofiltration: the use of plants to remove heavy metals from aqueous streams. *Journal of Environmental Science and Technology*. 29(5): 1239-1245.
19. **Epelde L, Hernández-Allica J, Becerril J. M, Blanco F and Garbisa C. (2008).** Effects of chelates on plants and soil microbial community: comparison of EDTA and EDDS for lead phytoextraction. *Journal of Science of the Total Environment*. 401(1): 21-28.
20. **Garg N and Singla P. (2012).** The role of *Glomus mosseae* on key physiological and biochemical parameters of pea plants grown in arsenic contaminated soil. *Journal of Scientia Horticulturae*. 143: 92-101.

21. **González-Guerrero M, Azcón-Aguilar C, Mooney M, Valderas A, MacDiarmid C. W, Eide D. Jand Ferrol N. (2005).** Characterization of a *Glomus intraradices* gene encoding a putative Zn transporter of the cation diffusion facilitator family. *Journal of Fungal Genetics and Biology*. 42(2): 130-140.
22. **Hadi F, Bano A and Fuller M. P. (2010).** The improved phytoextraction of lead (Pb) and the growth of maize (*Zea mays* L.): the role of plant growth regulators (GA₃ and IAA) and EDTA alone and in combinations. *Journal of Chemosphere*. 80(4): 457-462.
23. **Hernández-Ortega H. A, Alarcón A, Ferrera-Cerrato R, Zavaleta-Mancera H. A, López-Delgado H. A and Mendoza-López M. R. (2012).** Arbuscular mycorrhizal fungi on growth, nutrient status, and total antioxidant activity of *Melilotus albus* during phytoremediation of a diesel-contaminated substrate. *Journal of Environmental Management*. 95: S319-S324.
24. **Hseu Z. Y, Jien S. H, Wang S. H and Deng H. W. (2013).** Using EDDS and NTA for enhanced phyto extraction of Cd by water spinach. *Journal of Environmental Management*. 117: 58-64.
25. **Ikhuria E. U and Okieimen F. E. (2000).** Scavenging cadmium copper, lead, nickel and zinc ions from aqueous solution by modified cellulosic sorbent. *International Journal of Environmental Studies*. 57(4): 401-409.
26. **Jagetiya B and Sharma A. (2013).** Optimization of chelators to enhance uranium uptake from tailings for phytoremediation. *Journal of Chemosphere*. 91: 692-696.
27. **Joner E. J, Briones R and Leyval C. (2000).** Metal-binding capacity of arbuscular mycorrhizal mycelium. *Journal of Plant and Soil*. 226(2): 227-234.
28. **Kalinowski B. E, Liermann L. J, Brantley S. L, Barnes A and Pantano C. G. (2000).** X-ray photoelectron evidence for bacteria-enhanced dissolution of hornblende. *Journal of Geochimica et Cosmochimica Acta*. 64(8): 1331-1343.
29. **Kayser A, Wenger K, Keller A, Attinger W, Felix H. R, Gupta S. K and Schulin R. (2000).** Enhancement of phytoextraction of Zn, Cd, and Cu from calcareous soil: the use of NTA and sulfur amendments. *Journal of Environmental Science and Technology*. 34(9): 1778-1783.
30. **Lebeau T, Braud A and Jézéquel K. (2008).** Performance of bioaugmentation-assisted phytoextraction applied to metal contaminated soils: a review. *Environmental Pollution*. 153(3): 497-522.
31. **Leung H. M, Leung A. O. W, Ye Z. H, Cheung K. Cand Yung K. K. L. (2013).** Mixed arbuscular mycorrhizal (AM) fungal application to improve growth and arsenic accumulation of *Pteris vittata* (As hyperaccumulator) grown in As-contaminated soil. *Journal of Chemosphere*. 92(10):1367-74.
32. **Luo C, Shen Z and Li X. (2005).** Enhanced phytoextraction of Cu Pb Zn and Cd with EDTA and EDDS. *Journal of Chemosphere*. 59(1): 1-11.

33. **Luo C, Shen Z., Li X. and Baker A. J. (2006).** Enhanced phytoextraction of Pb and other metals from artificially contaminated soils through the combined application of EDTA and EDDS. *Journal of Chemosphere*. 63(10): 1773-1784.
34. **Ma Y, Prasad M. N. V, Rajkumar M and Freitas H. (2011).** Plant growth promoting rhizobacteria and endophytes accelerate phytoremediation of metalliferous soils. *Journal of Biotechnology Advances*. 29(2): 248-258.
35. **Malcová R, Vosátka M and Gryndler M. (2003).** Effects of inoculation with *Glomus intraradices* on lead uptake by *Zea mays* L. and *Agrostis capillaris* L. *Journal of Applied Soil Ecology*. 23(1): 55-67.
36. **Marques A. P, Oliveira R. S, Samardjieva K. A, Pissarra J., Rangel A. O. and Castro P. M. (2007).** *Solanum nigrum* grown in contaminated soil: Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on zinc accumulation and histolocalisation. *Journal of Environmental Pollution*. 145 (3): 691-699.
37. **Márquez-García B, Márquez C, Sanjosé I, Nieva F. J. J, Rodríguez-Rubio P and Muñoz-Rodríguez A. F. (2013).** The effects of heavy metals on germination and seedling characteristics in two halophyte species in Mediterranean marshes. *Journal of Marine Pollution Bulletin*. 70(1-2):119-24.
38. **Mehmood F, Rashid A., Mahmood T and Dawson L. (2013).** Effect of DTPA on Cd solubility in soil–Accumulation and subsequent toxicity to lettuce. *Journal of Chemosphere*. 90: 1805-1810.
39. **Neugschwandtner R. W, Tlustoš P, Komárek M and Száková J. (2008).** Phytoextraction of Pb and Cd from a contaminated agricultural soil using different EDTA application regimes: laboratory versus field scale measures of efficiency. *Journal of Geoderma*. 144(3): 446-454.
40. **Nowack B, Schulin R and Robinson B. H. (2006).** Critical assessment of chelant-enhanced metal phytoextraction. *Journal of Environmental science and technology*. 40(17): 5225-5232.
41. **Nwoko C. O. (2010).** Trends in phytoremediation of toxic elemental and organic pollutants. *African Journal of Biotechnology*. 9(37): 6010-6016.
42. **Orłowska E, Godzik B and Turnau K. (2012).** Effect of different arbuscular mycorrhizal fungal isolates on growth and arsenic accumulation in *Plantago lanceolata* L. *Journal of Environmental Pollution*. 168: 121-130.
43. **Punamiya P, Datta R, Sarkar D, Barber S, Patel M and Das P. (2010).** Symbiotic role of *Glomus mosseae* in phytoextraction of lead in vetiver grass [*Chrysopogon zizanioides* (L.)]. *Journal of Hazardous Materials*. 177(1): 465-474.
44. **Ribeiro de Souza S. C, Adrián López de Andrade S, Anjos de Souza L and Schiavinato M. A. (2012).** Lead tolerance and phytoremediation potential of Brazilian leguminous tree species at the seedling stage. *Journal of Environmental Management*. 110: 299-307.

45. **Seth C. S, Misra V, Singh R. R and Zolla L. (2011).** EDTA-enhanced lead phytoremediation in sunflower (*Helianthus annuus* L.) hydroponic culture. Journal of Plant and soil. 347(1-2): 231-242.
46. **Sheoran V, Sheoran A. S and Poonia P. (2011).** Role of hyperaccumulators in phytoextraction of metals from contaminated mining sites: A review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 41(2): 168-214.
47. **Smith S. E and Read D. J. (2010).** Mycorrhizal symbiosis. Access Online via Elsevier. P800.
48. **Soleimani M, Hajabbasi M. A, Afyuni M, Charkhabi A. H and Shariatmadari H. (2009).** Bioaccumulation of nickel and lead by Bermuda grass (*Cynodon dactylon*) and tall fescue (*Festuca arundinacea*) from two contaminated soils. Caspian Journal of Environmental Sciences. 7(2): 59-70.
49. **Solís-Domínguez F. A, Valentín-Vargas A, Chorover J and Maier R. M. (2011).** Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on plant biomass and the rhizosphere microbial community structure of mesquite grown in acidic lead/zinc mine tailings. Journal of Science of the Total Environment. 409(6): 1009-1016.
50. **Sooksawat N, Meetam M, Kruatrachue M, Pokethitiyook P and Nathalang K. (2013).** Phytoremediation potential of charophytes: Bioaccumulation and toxicity studies of cadmium, lead and zinc. Journal of Environmental Sciences. 25(3): 596-604.
51. **Sousa N. R, Ramos M. A, Marques A. P and Castro P. M. (2012).** The effect of ectomycorrhizal fungi forming symbiosis with *Pinus pinaster* seedlings exposed to cadmium. Journal of Science of the Total Environment. 414L: 63-67.
52. **Sudová R and Vosátka M. (2007).** Differences in the effects of three arbuscular mycorrhizal fungal strains on P and Pb accumulation by maize plants. Journal of Plant and Soil. 296(1-2): 77-83.
53. **Sudová R, Pavlíková D, Macek T and Vosátka M. (2007).** The effect of EDDS chelate and inoculation with the arbuscular mycorrhizal fungus *Glomus intraradices* on the efficacy of lead phytoextraction by two tobacco clones. Journal of Applied Soil Ecology. 35(1): 163-173.
54. **Wang X, Wang Y, Mahmood Q, Islam E, Jin X, Li T and Liu D. (2009).** The effect of EDDS addition on the phytoextraction efficiency from Pb contaminated soil by *Sedum alfredii* Hance. Journal of Hazardous Materials. 168(1): 530-535.
55. **Wendy Ann Peer, Ivan R. Baxter, Elizabeth L. Richards, John L. Freeman, Angus S. Murphy. (2005).** Phytoremediation and hyperaccumulator plants. Journal of Phytoremediation and hyperaccumulator plants, Vol. 14 300-339.
56. **Zhao Z, Xi M, Jiang G, Liu X, Bai Z and Huang Y. (2010).** Effects of IDSA, EDDS and EDTA on heavy metals accumulation in hydroponically grown maize (*Zea mays* L.). Journal of Hazardous Materials. 181(1): 455-459

"مجله ایمنی زیستی، دوره پنجم، شماره دوم، زمستان ۹۱"